


الحمد لله
الرحمن



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

دانشکده پزشکی

پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه

دکترای حرفه ای در رشته پزشکی

عنوان:

بررسی فراوانی و علل مرگ‌های ناگهانی ارجاعی به پزشکی قانونی شهرستان

اردبیل طی سالهای ۹۲-۱۳۸۸

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل فرزانه

استاد مشاور:

خانم دکتر نسرین فولادی

دکتر بهزاد ولیزاده

نگارش:

افسانه مفتخر اقدام

تابستان ۱۳۹۴

شماره پایان نامه

۰۵۴۲

ساکزاری

باساس فراوان از استاد ارجمندم دکتر اسماعیل فرزانه

باشکر از خانم دکتر نسرين فولادی، استاد کراتقدم

باشکر از هیئت داوران محترم

باشکر از دکتر گل محمدی، نماینده هی محترم دانشگاه در جلسه ی دفاعیه

باشکر از خانم نصیحی، مسئول محترم پژوهش و پایان نامه دانشکده پزشکی

تقدیم به خانواده ارجمندم

فصل اول: مقدمه و بیان مسئله

۱-۱ مقدمه و بیان مسئله	۲
۱-۲ تعریف واژه‌ها	۴
۱-۳ اهداف پژوهش	۵
۱-۳-۱ هدف کلی	۵
۱-۳-۲ اهداف اختصاصی	۵
۱-۳-۳ اهداف کاربردی	۵

فصل دوم: بررسی متون

۲-۱ مبانی نظری	۷
۲-۱-۱ علل مرگ‌های ناگهانی	۷
۲-۱-۱-۱ سیستم قلبی و عروقی	۸
۲-۱-۱-۲ سیستم تنفسی	۱۶
۲-۱-۱-۳ سیستم اعصاب مرکزی	۱۹
۲-۱-۱-۴ سیستم گوارش	۲۰
۲-۱-۱-۵ سیستم خونی	۲۲
۲-۱-۱-۶ سیستم ادراری تناسلی	۲۲
۲-۱-۱-۷ سیستم اندوکراین	۲۳
۲-۲ بررسی متون:	۲۳

فصل سوم: مواد و روش‌ها

- ۳-۱ نوع مطالعه ۲۷
- ۳-۲ جامعه آماری و روش نمونه‌گیری ۲۷
- ۳-۴ روش تجزیه و تحلیل آماری ۲۷
- ۳-۵ معیارهای ورود ۲۸
- ۳-۶ معیارهای خروج ۲۸
- ۳-۷ ملاحظات اخلاقی ۲۸
- ۳-۸ محدودیت‌های مطالعه ۲۸
- ۳-۹ جدول متغیرهای مطالعه ۲۹

فصل چهارم: نتایج

- ۴-۱ نتایج ۳۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه

- ۵-۱ بحث ۴۰
- ۵-۲ نتیجه‌گیری ۴۳
- ۵-۳ پیشنهادات ۴۴
- ۵-۴ محدودیت‌های مطالعه ۴۴
- منابع ۴۵

بررسی فراوانی و علل مرگ‌های ناگهانی ارجاعی به پزشکی قانونی شهرستان اردبیل

طی سالهای ۹۲-۱۳۸۸

چکیده

مقدمه و هدف: سازمان جهانی بهداشت، مرگی را که کمتر از ۲۴ ساعت پس از شروع علائم رخ دهد مرگ ناگهانی می‌نامد. مرگ ناگهانی می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد. هیچ یک از سیستم‌های بدن را نمی‌توان از اتهام ایجاد مرگ‌های ناگهانی مبرا نمود اما به نظر می‌رسد که سیستم قلبی-عروقی سهم بیشتری از این مرگ‌ها را به خود اختصاص می‌دهد؛ از منظر تجربی چنین می‌نماید که میانگین سنی موارد فوتی ناشی از این نوع مرگ نسبتاً کاهش یافته است، فلذا، مطالعه‌ای که به کندوکاو علل و صور چنین مرگ‌هایی بپردازد لازم است. بنابراین بر آن شدیم تا با طراحی این مطالعه فراوانی مرگ ناگهانی را طی ۵ سال اخیر یافته و علل منجر به آن را مشخص کنیم.

مواد و روشها: طی این مطالعه‌ی مقطعی توصیفی، تمام موارد متوفیان ناشی از مرگ‌های ناگهانی طبیعی که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ به پزشکی قانونی اردبیل ارجاع داده شده بودند و مجموعاً ۶۱۷ نفر بودند، بررسی شدند. اطلاعات سن، جنس، علت فوت و وضعیت بالینی قبلی استخراج و با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS نسخه‌ی ۱۹ مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: از ۶۱۷ مورد مورد بررسی، ۴۲۶ مورد مرد (۶۹/۰۴٪) و مابقی آنان زن بودند. میانگین سنی کلی متوفیان تحت بررسی $62/69 \pm 12/93$ بدست آمد. اکثریت مطلق مرگ‌های ناگهانی در سنین ۵۰ تا ۸۰ سال رخ داده‌بودند. در مردان، شایع‌ترین شغل یافت شده شغل آزاد (۴۲/۰۱٪) و در زنان خانه‌داری (۸۱/۱۵٪) بود. مصرف دخانیات شایع‌ترین اعتیاد در بین موارد فوتی بود. علت مرگ در ۷۰/۱۷٪ موارد بیماری‌های قلبی عروقی، ۷/۸٪ موارد ریوی، ۵/۸٪ موارد گوارشی بود. در ۳۵٪ درصد موارد سابقه‌ی بیماری‌های قلبی و عروقی مشاهده شد.

بحث و نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که جنسیت مذکر به عنوان ریسک فاکتور مرگ ناگهانی مطرح می‌باشد. همچنین، در سنین بالاتر، فراوانی مرگ‌های ناگهانی بیشتر است. سابقه بیماری قلبی-عروقی، دیابت و مصرف دخانیات در درصد قابل توجهی از متوفیان دیده می‌شود که می‌تواند آن‌ها را جزء ریسک فاکتورهای بروز مرگ‌های مطرح نماید. به نظر می‌رسد جدی‌تر گرفتن بیماری‌های قلبی-عروقی و عوامل مؤثر در بروز آن‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه مؤثر در بروز آن‌ها و نیز کنترل مناسب دیابت و عدم مصرف دخانیات می‌تواند نقش بسزائی در کاهش بروز مرگ‌های ناگهانی داشته باشد.

کلمات کلیدی: مرگ ناگهانی، پزشکی قانونی، بیماری قلبی عروقی